

G. GRIBODO. Diagnosi di alcune specie nuove del genere *Chrysis*.

Dappoichè mi sono dedicato allo studio degli Imenotteri, la ricca e brillante famiglia dellè Chrysidì non mancò, come era naturale, di attirare in modo particolare la mia attenzione, ed anzi da qualche tempo, in grazia dei ricchissimi materiali che la gentilezza di diversi miei corrispondenti pose a mia disposizione, lo studio speciale ed accurato della medesima occupa interamente le ore che per l' Entomologia mi son concesse dagli altri miei doveri.

Mentre sto preparando i materiali per un catalogo generale delle specie di questo gruppo, che ho in animo di pubblicare sotto forma di monografia, mi limito a dare qui brevi diagnosi di alcune specie il cui esame accurato mi fece credere non ancora conosciute: la loro descrizione più completa si troverà nell' or accennato lavoro monografico, che verrà pubblicato in questi Annali.

Torino, 30 Dicembre 1874.

1. **Chrysis Kriechbaumeri**, n. sp.

Parva, robusta, cyaneo-viridis, haud nitida: fronte et thorace crasse punctato-reticulatis, segmento abdominis 1° sparsim crasseque punctato, 2° et 3° confertissime subtiliter punctato-rugulosis subcoriaceis: serie ante-apicali subimmersa: margine anali brevi, integro, late arcuato-obtusò. Long. corp. mill. 4 $\frac{1}{2}$.

Hab. in Nova-Hollandia.

Riesce facile il riconoscere questa specie dalla singolare punteggiatura del suo addome, specialmente dei due ultimi segmenti: seguendo le tavole sinottiche del Dahlbom questa specie va collocata nella 1.ª sezione della 4.ª Falange.

2. **Chrysis halictula**, n. sp.

C. hilari Dahlb. affinis at notis sequentibus facillime dignoscitur: antennis filiformibus, articulis haud tumidiusculis: pronoti margine postico, lateribusque haud abnormibus: segmento abdominis tertio apice conspicue angustiore quam basi: serie antepicali modice abrupta. Long. corp. mill. 6.

Hab. in California.

3. **Chrysis Doriae**, n. sp.

C. cyaneae L. quoad habitum assimilis, sed ano integerrimo mox dignoscitur. Gracilis, viridi-cyanea, nitidiuscula: capite et thorace confertim subcrasse punctatis, abdomine sparsim et modice punctato: segmento 3^o apice distincte angustiore quam basi, arcuato subtruncato: serie antepicali modice abrupta, medio distincte interrupta, foveolis oblitteratis. Long. corp. mill. 4 $\frac{1}{2}$.

Hab. in America boreali.

4. **Chrysis Gestroi**, n. sp.

Robusta, capite thoraceque cupreo-aureis hinc illinc virescentibus, abdomine supra purpureo-aureo, subtus obscure cyaneo, facie pectore una cum pedibus virescentibus: clypeo magno subquadrato, prominente, antice profunde emarginato: capite thoraceque subcrasse, abdomine regulariter et modice, confertim punctatis: segmenti 3ⁱⁱ area antica tumida praesertim supra seriem antepicalem: hac valde abrupta et immersa; area anali humili, secundum marginem obsoletissime carinulata; margine integro. Long. corp. mill. 7.

Hab. in Algeria.

Specie rimarchevolissima per la forma del clipeo, e del terzo segmento dell' addome.

5. *Chrysis macrostoma*, n. sp.

Modice robusta et nitida, cyanea pronoto, dorsulo, abdominisque dorso cupreo-aureis: capite, pronoti latiore, magno elongato-trapezino, magis alto quam lato: corpore toto confertim subtiliter punctato, capite thoraceque fere coriaceis: abdomine elliptico, apice angustiore; serie anteapicali parum profunda: margine anali perfecte arcuato, integro. Long. corp. mill. 6.

Hab. in Algeria.

Il carattere più notevole di questa Chryside è la forma allungata, e larga nel tempo stesso della faccia e della bocca.

6. *Chrysis Australasiae*, n. sp.

Mediocris, robusta, convexiuscula viridi-cyanea, dorsuli area media verticeque violaceis: capite et thorace confertim irregulariter punctatis et punctulatis: abdomine regulariter punctato subreticulato, apice tam lato quam basi, longitudinem capitis thoracisque simul sumptorum superante; margine anali brevi, perfecte arcuato, dentibus quinque armato: dentibus minutis, spinoideis, 3 intermediis approximatis, laterilibus remotis. Long. corp. mill. 9.

Hab. in Nova-Hollandia.
